

# RJEŠENJA A

## ZADATAK 1A

1.

Formula	Istinitosna vrijednost
a) $\forall x \exists y Sxy$	I
b) $\exists x \forall y Syx$	N
c) $\forall x \forall y (\neg Sxy \vee Syx)$	I
d) $\exists x (Ux \wedge \neg \exists y (Uy \wedge Sxy))$	I
e) $\exists x \forall y ((\forall x \wedge Uy) \rightarrow Sxy)$	I
f) $\neg \exists x \neg \exists y Sxy$	I
g) $\forall x \forall y \exists z (x \neq y \rightarrow \neg (Szx \wedge Szy))$	I
h) $\forall x \forall y ((Ux \wedge Uy) \rightarrow x=y)$	N
i) $\forall x \forall y ((x \neq y \wedge ((\forall x \wedge Vy) \vee (Ux \wedge Uy))) \rightarrow \exists z \forall w ((Swx \wedge Swy) \leftrightarrow w = z))$	N

2.


Formula	Istinitosna vrijednost
a) $\exists x \forall y Sxy$	N
b) $\exists x \neg \exists y Sxy$	N
c) $\exists x \exists y \exists z (x \neq y \wedge Szy \wedge Szx)$	N
d) $\forall x \exists y (Syx \wedge \forall z (z \neq y \rightarrow \neg Sxz))$	I
e) $\exists x \exists y \exists z (x \neq y \wedge x \neq z \wedge y \neq z \wedge Ux \wedge Uy \wedge Uz)$	I
f) $\forall x \forall y \forall z (\neg (Sxy \vee Sxz \vee Syz) \rightarrow \exists w (Swx \vee Swy \vee Swz))$	I
g) $\forall x \forall y (Sxy \rightarrow \exists z (z \neq x \wedge z \neq y \wedge (Szx \vee Szy)))$	N
h) $\forall x (\neg \forall x \rightarrow \exists y (\forall y \wedge Sxy))$	I

*Ukupno 51 bod.*

## ZADATAK 2A


Uz svaki podzadatak naveden je maksimalan broj bodova predviđenih za taj podzadatak. Rješenja su otisnuta crno, a zadani dijelovi dijagrama sivo.

1.




3

2.




3

3.




3

4.




3

5.




3

6.




12


1




3



6



6




24


Ukupno 66 bodova.

ZADATAK 3AB


1.




I 4 C




II 5 G




III 3 F




IV 7 H




V 6 B



VI 2 D



VII 8 A



VIII 1 E

Svaka točno unesena oznaka donosi po 3 boda, pogrešno unesena 0 bodova, a izostavljena 1 bod.  
Ukupno 48 bodova.


2.

Svaki **filozof** je ili **matematičar**, ili **logičar**.

\* može i: Svaki **filozof** je ili **logičar**, ili **matematičar**.)

$$\neg \exists x ((Mx \leftrightarrow Lx) \wedge Fx)$$

\* može i:  $\forall x \neg ((Mx \leftrightarrow Lx) \wedge Fx)$



Svaki dobro riješen iskaz/dijagram donosi po 3 boda. Pogrešno ili djelomično 0 bodova, a izostavljeno rješenje po 1 bod.  
Ukupno 9 bodova.

Ukupno 57 bodova.

### ZADATAK 4AB

1.

	<b>B1</b>	<b>B2</b>	<b>B3</b>
<b>A1</b>	<b>DA</b>	<b>NE</b>	<b>DA</b>
<b>A2</b>	<b>NE</b>	<b>DA</b>	<b>DA</b>
<b>A3</b>	<b>DA</b>	<b>DA</b>	<b>NE</b>

2.

- 2.1.  $\forall ba$  **B1**  
2.2.  $\forall bb$  **B2**  
2.3.  $\forall aa \wedge \neg \forall ab$  /  
2.4.  $\forall x(\forall ax \leftrightarrow x=a)$  **A3**  
2.5.  $\forall x(\forall xa \leftrightarrow x=a)$  **A2**  
2.6.  $\forall x(\forall xx \leftrightarrow x=a)$  **A1**  
2.7.  $\neg \exists x(x \neq a \wedge \forall xa)$  /  
2.8.  $\neg \exists x(x \neq a \wedge \forall xx)$  /  
2.9.  $\neg \exists x(\forall xa \leftrightarrow x \neq a)$  **A2**

*Svako se posebno rješenje boduje posebno. Točno rješenje donosi 3, izostavljeno 1, a pogrešno 0 bodova.  
Ukupno 54 boda.*

### ZADATAK 5AB

1. /, /, I, /. (4 x 3 boda = 12 bodova)

2. I, N, N, N. (4 x 3 boda = 12 bodova)

3. a, b, d (Ukupno 6 bodova. Rješenje se priznaje ako i samo ako su odabrani svi i samo točni odgovori).

4. I, N, N, N, I N, /. (7 x 3 boda = 21 bod)

5. d (3 boda)

**Ukupno 54 boda.**

**ZADATAK 6AB\***

\* Zadatak u A i B testu razlikuje se samo u zadanim simbolima u šestome retku.

<b>1</b>	<b><math>(A \vee B) \rightarrow C</math></b>	<b>p</b>	<b>/ dopušta se i <math>(B \vee A) \rightarrow C</math></b>
<b>2</b>	<b>A</b>	<b>p</b>	
<b>3</b>	<b><math>A \vee B</math></b>	<b>2 u<math>\vee</math></b>	<b>/ dopušta se i <math>B \vee A</math>, ali samo ako odgovara koraku 1</b>
<b>4</b>	<b>C</b>	<b>1,3 MP</b>	
<b>5</b>	<b><math>A \wedge C</math></b>	<b>2,4 u<math>\wedge</math></b>	<b>/ dopušta se i <math>C \wedge A</math> (samo u A testu)</b>
<b>6</b>	<b><math>A \rightarrow (A \wedge C)</math></b>	<b>2-5 u<math>\rightarrow</math></b>	<b>/ dopušta se i <math>A \rightarrow (C \wedge A)</math>, ali samo ako odgovara koraku 5 (samo u A testu)</b>

Brojke u tumačenjima koraka 4 i 5 smiju stajati i obrnuto: **3,1 MP**, odnosno, **4,2 u $\wedge$** . Također, poredak brojčanih i nebrojčanih sastavnica tumačenja, iako nije standardno, smije biti i obrnut, npr. **MP 3,1**.

*Svaki i samo potpuno točno ispunjeni redak donosi 3 boda.*

*Potpuno prazan redak: 1 bod.*

*Pogrešno ili nepotpuno ispunjen redak: 0 bodova.*

**Ukupno 18 bodova.**